

Использование Трансфер фактора при заболеваниях мочевыделительной системы.

Женщина 45 лет, Санкт-Петербург.

Диагноз: хронический часто рецидивирующий пиелонефрит, обострение.

Получала Трансфер фактор™ по 1 капсуле ежедневно. Курс проводился в течение 1.5 мес.

Дополнительно: ЭПАМ 900 по 5 кап. в день, ЭПАМ «Возрождение 3» по 15 кап. в день.

Результат: Через 2 дня нормализовалась температура, исчезли болезненное и учащенное мочеиспускание. Анализ мочи через 5 дней в норме. В настоящее время стойкая ремиссия.

Мальчик 6 лет, Санкт-Петербург.

Диагноз: Гидронефроз обеих почек. Операция в 2002 г.

Получал Трансфер фактор™ по ½ капсулы. 1 раз в день 2 недели, затем по капсуле 1 раз в день 2 недели.

Затем по 1 капсуле 2 раза в день 10 дней.

Результат: В течение всего лета находился в детском лагере в Ленинградской области, простудными заболеваниями не болел.

М., Санкт-Петербург

Мужчина 51 год.

В анамнезе мочекаменная болезнь, гломерулонефрит. В настоящий момент – вторично сморщенная почка, ХПН (хроническая почечная недостаточность).

Находился на гемодиализе 2 раза в неделю, выделял 100мл мочи в сутки, креатинин 9,3.

Ждет трансплантации почек. После каждого гемодиализа выделяет до 5 литров жидкости, за пару дней снова набирает.

Начал принимать Трансфер фактор™. После 3 месяцев приема начал понемногу выделять мочу и днем, и ночью. На гемодиализе объем выделяемой жидкости сократился до 1 л.

Через 4,5 месяца приема «ТФ» начал снижаться креатинин – до 7,3.

Самочувствие удовлетворительное.